

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				✓	✓	✓					

RAPPEL DES BONS GESTES POUR RÉUSSIR SON IMPLANTATION DE IBIZA/ KIKUYU/ GOBI/ LM

Cette fiche vous donne des conseils pour le semis mais elle ne garantit pas sa réussite car elle dépend de nombreux facteurs (sol, enfouissement, fourmis, mise en œuvre des graines, densité, arrosage, météo, engrais...)

Nous conseillons toujours de le faire faire par un professionnel.

- ✓ **TIMING** : **ne pas semer trop tôt !** Sinon la germination ne se fera pas. Il est impératif d'attendre fin mai, juin ou juillet avant de semer **et seulement après une période de 15 jours consécutifs avec une T°C de 26-27°C**. En respectant cette préconisation, la germination sera optimale. **Pas de semis après début Août car il faut au moins 3 mois aux gazons C4 pour s'implanter correctement et passer la dormance du 1^{er} hiver.**
- ✓ **DOSAGE** : 10-15g/m² : inutile de charger plus.
- ✓ **PROFONDEUR** : 1-1,5cm max car ce sont des petites graines. **Nous vous conseillons très fortement d'intégrer de l'ANTI-FOURMI** lors du semis.
- ✓ **ROULER** le sol après avoir semé.
- ✓ **ARROSAGE** :
 - **Jusqu'à la levée** : tenir humide par petits arrosages quotidiens (petits volumes mais fréquents) jusqu'à la levée complète des graines.
 - **A la levée** : diminuer la fréquence d'arrosage mais augmenter les volumes
 - Objectif à semaine 3 : 1 jour sur 2 (10 mm/m²)
 - Objectif à semaine 5 : 1 jour sur 3 (15 mm/m²)
 - **La 1^{ère} année**, et surtout pendant les 2/3 premiers mois du semis selon les chaleurs, **3 arrosages par semaine est conseillé** pour permettre une bonne implantation du gazon.
- ✓ **TONTE** :
 - **Un mois après la levée** : tondre à 2cm
 - **Une fois implanté** : tondre très court pour forcer le gazon à s'épaissir, rester dense et esthétique.
- ✓ **ENGRAIS** : Au moment du semis ou après la levée des graines, pour stimuler la croissance, nous préconisons fortement l'utilisation d'un engrais dit « starter » ayant une composition NPK proche de 10-20-5.

A L'AUTOMNE

- ✓ **SUR-SEMIS DE RAYGRASS ANNUEL** : entre le 15 septembre et le 15 octobre (dès la deuxième année d'implantation du Cynodon/bermuda/kikuyu pour éviter de dégrader son enracinement), vous pouvez tondre à ras, scarifier et sursemmer avec du gazon Raygrass annuel Thunder (en vente sur notre site ou inclus dans les packs) pour accompagner la dormance hivernale de votre gazon des climats chauds.
- ✓ **SCARIFIER** : au printemps (fin mai, début juin), vous pouvez scarifier votre gazon pour le stimuler et le densifier.

Le résultat définitif sera atteint pendant l'été de la 2^{ème} année après le semis.

Nota : La date sur les emballages correspond à la date du dernier test de germination (c'est un contrôle du producteur avant conditionnement). La germination des semences peut se faire sous un délai de 2 à 3 ans après cette date si le paquet est bien conservé.

Fiches téléchargeables



Températures

T° optimale de croissance (Air)	25 - 38°C
T° arrêt de pousse (moyenne du sol à 5cm)	8 - 11°C
T° de germination des graines (Sol)	> 21°C
T° de germination des graines (Air)	25 - 35°C
T° de dormance (minimale du sol à 10cm)	< 12°C

Bonne implantation et profitez agréablement de votre gazon !

L'équipe de Gazon sécheresse