



RAPPEL DES BONS GESTES POUR RÉUSSIR SON IMPLANTATION DE GAZON RUSTIQUE SECHERESSE ou PRAIRIE RUSTIQUE

Cette fiche est un conseil de semis, elle ne garantit pas la réussite du semis qui varie en fonction de nombreux facteurs.

Une fiche conseil détaillée sera jointe à votre commande.

- ✓ **TIMING** : semer de mars à début juin ou entre Septembre et Novembre
- ✓ **DOSAGE** : 25-35g/m² ou 50g/m² en regarnissage
- ✓ **PROFONDEUR** : 1-1,5cm environ
- ✓ Nous vous conseillons très fortement **d'intégrer de l'ANTI-FOURMI** lors du semis.
- ✓ **ENGRAIS** : Afin d'accélérer l'implantation et stimuler le système racinaire, nous vous conseillons d'appliquer notre engrais spécial SEMIS : GS STARTING au moment du semis et à + 20 jours, ensuite le GS KEEPGREEN à + 30 jours.
- ✓ **ROULER le sol** après avoir semé.
- ✓ **ARROSAGE** :
 - **Jusqu'à la levée** : tenir humide par arrosage quotidien (petits volumes mais fréquents) jusqu'à la levée complète des graines.
 - **A la levée** : diminuer la fréquence d'arrosage mais augmenter les volumes
 - Objectif à semaine 3 : 1 jour sur 2 (environ 10/15 mm par m²)
 - Objectif à semaine 5 : 1 jour sur 3 (environ 10/15 mm par m²)
 - **La 1^{ère} année**, et surtout pendant les 2/3 premiers mois du semis selon les chaleurs, **3 arrosages par semaine est conseillé** pour permettre une bonne implantation du gazon.
 - Ces valeurs d'arrosage sont préconisées pour un semis au printemps/ un semis automnal sera à adapter largement à la baisse selon les pluies automnales.
- ✓ **TONTE** :
 - **Un mois après la levée** : tondre mais pas au plus ras
 - **Une fois implanté** : tondre selon votre choix. Sachez que le gazon résistera mieux à la chaleur et la sécheresse s'il n'est pas tondu au plus bas.
- ✓ **SCARIFIER** : au printemps (fin mai, début juin), vous pouvez scarifier votre gazon pour le stimuler et le densifier.

Bonne implantation et profitez agréablement de votre gazon !

L'équipe de Gazon sécheresse

Nota : La date sur les emballages correspond à la date du dernier test de germination (c'est un contrôle du producteur avant conditionnement). La germination des semences peut se faire sous un délai de 2 à 3 ans après cette date.